

EC FERTILIZER
Bakır (Cu-Oksiklorür), Mangan (Mn-Oksit) ve
Çinko (Zn-Oksit) Sıvı Mikro Bitki Besin
Maddeleri Karışımı

Polifera® Mannezia

Garanti Edilen İçerik	w/w
Toplam Bakır (Cu)	% 1,6
Toplam Mangan (Mn)	% 11,5
Toplam Çinko (Zn)	%4,9

KULLANIM ALANI, MİKTARI VE DÖNEMİ*

Bitki	Dozlar	Uygulama Dönemi
	Topraktan Uygulama	
Yumuşak Çekirdekli Meyveler (Elma, Armut, Ayva,...)	1,5-2 L/da	Çiçek öncesi dönemden itibaren 10-15 gün aralıklarla 2-3 kez uygulama
Sert Çekirdekli Meyveler (Zeytin, Şeftali, Kiraz, Kayısı,...)		
Sert Kabuklu Meyveler (Fındık, Ceviz, Badem, Antepfıstığı,...)		
Turunçgiller (Portakal, Mandalina, Limon, Greyfurt,...)		
Üzümsü Meyveler (Üzüm, İncir, Muz, Nar, Çilek,...)		
Sebzeler (Domates, Hıyar, Biber, Patlıcan, Kavun, Karpuz,...)		Çiçek öncesi dönemden itibaren 15-20 gün aralıklarla 2-3 kez uygulama
Diğer sebzeler (Lahana, Marul, Karnabahar, Ispanak,...)		
Endüstri bitkileri (Tütün, Pamuk, Pancar,...)		
Yağ Bitkileri (Zeytin, Ayçiçeği, Yerfıstığı,...)		
Baklagiller (Nohut, Mercimek, Fasulye,...)		
Yumrulu Bitkiler (Patates, Şekerpancarı, Soğan, Havuç,...)	Yumru oluşumuyla birlikte 1-2 kez uygulama	
Kesme Çiçek ve Fidanlar	1-1,5 L/da	3 yapraklı dönemden itibaren gelişim dönemi boyunca 2-3 kez uygulama
Tahıllar (Buğday, Arpa, Mısır, Çeltik,...)		

*Tavsiye niteliğinde olup, iklim, fenoloji, bitki, toprak özelliklerine göre uygulama dönemi ve dozlara karar verilebilir.

FİRMA BEYANI

Üretici firma, tavsiyelere uyularak depolandığı ve kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım, depolama ve karışımlardan doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama nedenleriyle karşılaşılabilecek toksisite, kalıntı, yetersiz etki vb. sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

ÇÖZÜNÜRLÜK ve KARIŞABİLİRLİK

Ürün (SC) süspansiyon konsantre formülasyonundadır. Farklı ürünler ile karıştırılıp birlikte uygulanmak istenirse önceden kavanoz testi yapılarak karar verilmesi tavsiye edilir.

Nativi Tarım A.Ş.
Çınarlı Mh. Ankara Asfaltı Cd.
Mistral Office Tower, 35170
No:15 K:8 D:087 Konak İzmir
Karşıyaka VD. 630 102 1892
Mersis No: 0630102189200001


Durmuş DEMİR
Şirket Vekili

DEPOLAMA ŞARTLARI

Ürünü orijinal ambalajında, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz, direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Depolama alanında patlayıcı, alev alan ve diğer kimyasal maddelerden uzak tutunuz. Normal şartlarda raf ömrü süresi boyunca fiziksel ve kimyasal özelliklerini korur. Depolama sıcaklığı +5 ile +40 °C derece arasında olmalıdır.

UYARILAR

- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Güçlü rüzgârlı ve güneşli zamanlarda uygulama yapmaktan kaçınınız.
- Asla uygun doz oranlarını aşmayınız! Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız!
- Uygulama esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.
- Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz teması halinde bol su ile yıkayınız.
- Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp imha ediniz.
- Toprak ve yaprak analizi yaptırarak ürün kullanılmasını tavsiye ederiz.



BAKANLIK LİSANS NO: 5582	ÜRETİM TARİHİ: Ambalaj üzerindedir.	PARTİ NO: Ambalaj üzerindedir.
BAKANLIK TESCİL NO:	SON KULLANMA TARİHİ: Ambalaj üzerindedir.	HACİM: 10 L / NET AĞIRLIK: 15,9 kg

ÜRETİCİ FİRMA Lebosol® Dünger GmbH Wiesengasse 28 67471 Elmstein Almanya	İTHALATÇI FİRMA Nativi Tarım A.Ş. Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. Mistral Office Tower, No:15/87 35170 Konak İzmir Türkiye
---	--

TAAHHÜT

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

Nativi Tarım A.Ş.
Çınarlı Mh. Ankara Asfaltı Cd.
Mistral Office Tower, 35170
No:15 K:8 D:087 Konak İzmir
Karşıyaka VD. 630 102 1892
Mersis No: 0630102189200001

Durmuş D. F.
Şirket Müdürü